

Clef des Helicidées d'Auvergne Limousin

1 – coquille aplatie, fortement carénée sur son pourtour, ouverture ovale, ombilic net et profond

..... [Soucoupe commune – Helicigona lapicida](#)



1- coquille ± globuleuse, ombilic +/- petit, caché en toute ou partie par la lèvre columellaire



2- coquille à spire peu élevée, ouverture ovale à lèvre (péristome) réfléchi, coquille en général à une seule bande foncée ± nette, ombilic bien visible

..... [Hélicon méridional – Chilostomma squammatinum](#)

2- coquille assez globuleuse à ombilic caché ou presque par un repli de la lèvre columellaire, coquille ± marquée de bandes colorées

3- ombilic partiellement ouvert, souvent réduit à une simple fente

4- coquille adulte < 2.5 cm



5- péristome blanc réfléchi, ouverture arrondie, coquille marbrée en général à une seule bande sombre, corps sombre

5- péristome non réfléchi, marqué en général à l'intérieur de rose, coquille à plusieurs bandes colorées, corps clair (*présence non naturelle*) [Caragouille rosée – Theba pisana](#)

4- grosse coquille adulte >3cm jusqu'à 5 cm

6- coquille marquée de nettes larges bandes sombres spirales et/ou bandes verticales, ombilic bien visible

(*espèce introduite*) [Escargot turque – Helix lucorum](#)
6- coquille à couleur assez uniforme, parfois de larges bandes plus sombres indistinctes, ombilic très petit

[Escargot de Bourgogne – Helix pomatia](#)

3- ombilic invisible recouvert par un repli de la lèvre columellaire



7- coquille sans bandes colorées continues, marbrée, corps sombre, taille >25mm.....

..... [Escargot petit-gris – Cornu aspersum](#)

7- coquille avec ou sans bandes colorées, couleur de fond variable mais jamais marbrée, taille <25mm, corps clair



8- coquille à spire peu élevée et à péristome présentant une bande sombre

..... [Escargots des haie – Cepaea nemoralis](#)

8- coquille plus globuleuse à péristome sans ligne sombre

..... [Escargot des jardins – Cepae hortensis](#)